PYRECRIS

20 g/l de pyrèthre

Présentation du produit

- **Nom Commercial** : PYRECRIS
- **Classe du produit** : Insecticide biologique
- **Numéro d'autorisation de vente au Maroc** : F04-3-011
- **Type de formulation** : Concentré Emulsionnable (EC)
- **Composition chimique :** 20 g/l de pyrèthre
- **Mode d'action :**
  Effet choc : Il en résulte d'une hyperactivité de l'insecte suivi par des convulsions, perte de coordination, la paralysie et la mort de l'insecte. Cet effet d'action rapide a pour nom de « knock down », présentant des grands avantages pour contrôler les fortes attaques liées aux insectes nuisibles aux plantes. D'autres insectes peuvent être échappés à des traitements, ceci peut être dû à l'utilisation à des doses sublétales et par conséquent le prince actif se dégrade rapidement à l'intérieur des insectes due à des procédés d'oxydation enzymatique.
  Effet répulsif : PYRECRIS présente en plus un grand effet répulsif sur une grande partie des insectes nuisibles aux plantes, même s'il est utilisé à des doses faibles. Les espèces sensibles montrent des réactions hyperactives et des mouvements anormaux.
- **Site d'action :** Au niveau du système nerveux, il agit sur le mouvement des ions de sodium et par la suite un blocage des canaux d'échange.

Efficacité

Culture	Cible	Dose	Volume de bouillie	Intervalle d'application
Culture maraichères	Pucerons, mouche blanche, thrips et chenilles…	200-400 ml/hl (1,6-8 L/Ha)	Cultures<50 cm : 800 à 1000 L/Ha Cultures (50 à 125 cm) :1000 à 1500 L/Ha Cultures>125 cm : 1500 à 2000 L/Ha	En préventif : 3-4 applications (intervalle de 8-10 jours) En curatif : 2 à 3 applications avec 6-8 j d'intervalle pH=6-7
Agrumes et arbres fruitiers	Pucerons, thrips, mineuse, mouche de cerisier…	200-400 ml/hl (1-6 L/Ha)	500 L/Ha en fonction de la hauteur des plants	En préventif : 3-4 applications (intervalle de 8-10 jours) En curatif : 2 à 3 applications avec 6-8 j d'intervalle pH=6-7
Olivier	Mouche de l'olivier,	200-400 ml/hl (1,6-6,4 L/Ha)	400 L/Ha en fonction de la hauteur des plants	2 à 3 applications, au début du vol pH=6-7
Pomme de terre	coléoptères	300-500 ml/hl (2,4-6,0 L/Ha)	800 à 1200 L/Ha	Chaque 8 à 12 j en fonction de la sévérité de l'attaque, en cas de forte attaque, mélanger avec VIAMOL pH=6-7
Petit pois, haricots, carottes et autres…	Pucerons, mouche blanche, thrips, chenilles…	200-400 ml/hl (1,6-4,8 L/Ha)	800 à 1200 L/Ha	En préventif : 3-4 applications (intervalle de 8-10 jours) En curatif : 2 à 3 applications avec 6-8 j d'intervalle pH=6-7

Conditions d'emploi

- **Mode d'emploi :** PYRECRIS est recommandé d'être appliqué par voie foliaire.
- **Période d'emploi :** Il est essentiel de commencer les traitements en préventif dès la détection des premiers symptômes d'attaque. En cas de forte attaque, il est convenable de la réduire en utilisant le PYRECRIS ou autres insecticides de contact.il est recommandé aussi d'utiliser des plaques collantes pour mieux contrôler les premiers vols des noctuelles.
- **Recommandations d'emploi :**

  Il est essentiel de bien mouiller la masse foliaire en concentrant les buses à la face inférieure des feuilles, ainsi que toutes les parties de la plante, qui présentent un refuge d'insectes. On recommande d'augmenter le volume de la bouillie par hectare de 20 à 30 % par rapport aux utilisations des pesticides chimiques.

  Les pyrèthres naturels sont photosensibles, leur efficacité se voit à des températures faibles. Généralement, on note une diminution de l'efficacité à des températures au dessus de 28 ° C. Il est donc recommandé de traiter à des heures où l'ensoleillement est minime, de préférence le soir ce qui améliore l'efficacité et la persistance et aussi éviter les dommages à certains prédateurs.

- **Conditionnement :** 1 et 5 litres.